

elongatis. 1.2-1.5 cm longis hirsutis. Amenta foeminea ignota. Amenta fructifera subsessilia, ascendenitia, cylindrica, 2-3 cm longa, cum fructibus 1.5 cm lata. Capsula matura 5-6 mm longa, glabra leviter castanea.

Hab. Hualien Hsien. Chingshuishan (清水山). Leg.: C.C. Liao (廖秋成), s.n. April. 1. 1976, Holotype, NTUF; S.S. YING. 4916, Aug. 1987, NTUF.

This species looks like *S. taiwanalpina* Kimura in general appearance, but is distinguishable from the latter by the dimorphic male aments, ovate and elliptic leaves with obtuse or rounded apex and glabrous capsules.

\* \* \* \*

台湾から 3 種類の新しい植物を報告する。ヤマボクチ属は台湾では初めてである。花蓮県の清水山は石灰岩の山で、幾つかの固有種が知られている所である。このヤナギの 1 種は外観は *Salix taiwanalpina* に似るけれど、雄花序が 2 型であるなど色々な点で異なる。清水山固有の種類と考えられる。

○新品種アケボノヤイトバナ (浅井康宏) Yasuhiro ASAI: On a new form of *Paederia scandens* Merr. var. *mairei* Hara

周知のようにヘクソカズラ(ヤイトバナ)は極めて分布の広い多年草で、現在まで葉や花の形状にもとづいて、種々の変異品が記録されてきた。しかしながら花色については、余り俎上にのぼって来なかったようである。

すなわち本種の鐘状をした花は通常、内面が紅紫色を帯びるが、外面は灰白色を呈している。ところで蕾の状態の時から、外面も内面同様に顕著な紅紫色を呈し、異彩を放つものが認められる。これにアケボノヤイトバナの和名を与え、記録しておくことにしたい。

終りに資料その他につき、種々御援助いただいた津山尚博士ならびに渡辺ヨシノ氏に対し感謝の意を表する。

*Paederia scandens* (Loureiro) Merrill var. *mairei* (Léveillé) Hara, Enum. Spermat. Japon. 2: 24 (1952).

form. **rubescens** Asai, f. nova

Tubus corollae exteriore viso rubro-purpureus non cinereo-albidi.

Hab. Japonia; Hondo: On sunny grass site of Wakasu (若洲), reclaimed land of Koto-ku (江東区), Tokyo (Y. Asai, Aug. 21, 1987—Type in TNS. no. 494605).

(東京歯科大学)